

**Ordenes Médicas para
Infarto Agudo del Miocardio con Elevación del ST**

Ficha de Identificación

Nombre (s): _____

Apellidos: _____

Fecha de Nac: dd / mm / aaaa

Sexo: M F

Esta herramienta clínica no intenta reemplazar el juicio médico o las necesidades individuales del paciente

Fecha: Hora: Diagnóstico: IAM-CEST <3h IAM-CEST 3-12h IAM-CEST >12h
 Ingresar a: Sala de Choque UCI Intermedios
 Condición: Muy grave Grave Reservada

Si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable continúe abajo, sino use la guía adecuada

Indicaciones para las 48 horas siguientes a la admisión

Dieta

- Nada vía oral 6 horas (solo fármacos indicados)
- Líquidos claros después de 6 horas
- Sí tolera iniciar dieta blanda baja en grasas
- Posición** Sentado Fowler Semifowler
- Oxígeno** ____ L/min Puntas Mascarilla
(Sí dolor torácico, disnea, satO2 menor de 93%)

Monitoreo continuo y cuidados (Informar y confirmar)

- Cambios en nivel del ST
- Cambios en morfología del QRS
- Arritmia sostenida
- PAS mayor de 160 o menor de 100 mmHg
- FC mayor de 100 o menor de 50 lpm
- SatO2 menor de 90% o FR mayor de 30 rpm
- Desfibrilador listo al lado del paciente
- ECG prn (angina, arritmia, bloqueo, cambio QRS)
- ECG 6 AM o en caso de angina

Acceso venoso periférico 1 vía 2 vías

- Cateter sellado (purgar c/12 hrs)
- Solución fisiológica @ ____ ml/h por ____ hrs

Exámenes de laboratorio (24 hrs después de admisión)

- TP/TPT
- CPK-MB Troponina I

Otros:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

| Pronóstico | Score | Mortalidad |
|------------|--|--|
| GRACE | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % en hospital |
| TIMI | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % a 30 días |

Dr. Nombre y firma

Recomendaciones Clase I por las Guías del ACC/AHA

- Morfina** 2 mg IV c/5 minutos (máximo 20 mg) en caso de angina persistente
- Nitroglicerina** 0.4 mg SL c/5 min en caso de angina
 50 mg/250 solución Glucosada al 5% iniciar IV a 10 mcg/min (3 ml/hr)
- Aspirina** 100 mg VO c/24 hrs
- Clopidogrel** 75 mg VO c/24 hrs
- Anticoagulación**
Heparina ____ UI/hr (12 UI/Kg/hr)
Mantener TPT 45-70 seg
- Enoxaparina <75 años ____ mg SC c/12h (1 mg/Kg)
 >75 años ____ mg SC c/12h (0.75 mg/Kg)
- Betabloqueador**
Metoprolol 5 mg IV lento en 2 min c/5 min x 2 (Lopresor) 25 mg VO c/6h x 48h
- IECA o ARA2**
Captopril 6.25 mg VO c/6h x 48h
Losartan 12.5 mg VO c/12h x 48h
- Estatina**
Atorvastatina 80 mg VO c/24 hrs
Pravastatina 40 mg VO c/12 hrs

Otros

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

NUNCA DEJE SOLO AL PACIENTE