

**Ordenes Médicas para  
Síndromes Coronarios Agudos SEST**

Ficha de Identificación

Nombre (s): \_\_\_\_\_

Apellidos: \_\_\_\_\_

Fecha de Nac: dd / mm / aaaa

Sexo:  M  F

*Esta herramienta clínica no intenta reemplazar el juicio médico o las necesidades individuales del paciente*

Fecha:       Hora:       Diagnóstico:  **IAM-SEST**  **Angina Inestable**  **Probable SICA**  
 Ingresar a:  Sala de Choque  UCI  Intermedios  
 Condición:  Muy grave  Grave  Reservada

*Inicie manejo sin demora, avise al Urgenciólogo de guardia, revise indicaciones/contraindicación/pronóstico*

**Indicaciones para la primera hora de admisión**

**Nada vía oral** (excepto fármacos indicados)  
**Posición**  Sentado  Fowler  Semifowler  
 **Oxígeno** \_\_\_\_ L/min  Puntas  Mascarilla  
 (Si hay dolor torácico, disnea, satO2 menor de 93%)

**Monitoreo continuo y cuidados** (Informar y confirmar)

Cambios en nivel del ST  
 Cambios en morfología del QRS  
 Arritmia sostenida  
 PAS mayor de 160 o menor de 100 mmHg  
 FC mayor de 100 o menor de 50 lpm  
 SatO2 menor de 90% o FR mayor de 30 rpm  
 ECG en 1 hora o en caso de dolor recurrente

**Acceso venoso periférico**  1 vía  2 vías

Cateter sellado (purgar c/12 hrs)  
 Solución fisiológica @ \_\_\_\_ ml/h por \_\_\_\_ hrs

**Exámenes de laboratorio**

Biometría hemática  Química sanguínea  
 TP/TPT  Electrolitos séricos  
 CPK-MB  Troponina I

Radiografía de Tórax portatil

**Otros:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Dr.

Nombre y firma

*Recomendaciones Clase I por las Guías del ACC/AHA*

**Morfina**  2 mg IV c/5 minutos (máximo 10 mg)  
**Nalbufina**  2 mg IV c/5 minutos (máximo 10 mg)

**Isosorbide**  5 mg SL c/5 min (máximo 3 dosis)  
**Nitroglicerina**  50 mg/250 solución Glucosada al 5%  
 iniciar IV a 10 mcg/min (3 ml/hr)

**Aspirina**  300 mg VO inicial/impregnación

**Clopidogrel**  600 mg VO inicial/impregnación

**Heparina**  \_\_\_\_ UI/bolo IV (60 UI/Kg) seguido de  
 \_\_\_\_ UI/hr en infusión (12 UI/Kg/hr)

**Enoxaparina**  <75 años bolo/30 mg IV seguido por  
 \_\_\_\_ mg SC a los 15 minutos (1 mg/Kg)  
 >75 años sin bolo  
 \_\_\_\_ mg SC (0.75 mg/Kg)

**Metoprolol**  5 mg IV lento/2 min, c/5 min x 2  
 25 mg VO ahora

**Captopril**  6.25 mg VO ahora

**Losartan**  12.5 mg VO ahora

**Otros:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

**NUNCA DEJE SOLO AL PACIENTE**